

What kind of problem do I have?

Chancroid

What is chancroid?

Chancroid is caused by a germ, or bacteria, that causes sores or lesions on the genital area and swollen lymph nodes in the groin.

How do I get chancroid?

Chancroid is passed from person to person through sexual contact. Infection occurs when the chancroid lesion on one person is exposed to mucous membranes or broken skin of a sexual partner.

How can I tell if I have chancroid?

Chancroid causes one or several painful ulcers or lesions on the penis, or on or around the vagina or rectum. These ulcers first begin as tender papules surrounded by redness. Then they become painful ulcers which frequently have a bad odor. The ulcers are usually more painful in men. There can also be pain with urination, rectal pain or bleeding, and for women, a vaginal discharge and pain during sex. Often, the lymph nodes in the groin are swollen and painful and they can rupture.

Is chancroid dangerous?

Chancroid can be a serious infection. The lesions can get a secondary infection. Also, because of infection, the penis can swell and become very painful. The lymph nodes in the groin can swell and rupture, causing serious health problems. The lesions can also cause scars.

How do I get rid of chancroid?

Chancroid can be cured with antibiotics. Usually a person will be given an injection, but sometimes pills may be given.

What about my partner?

It is very important that your partner(s) is treated for chancroid. It is very important that you tell all of your partners to be examined and treated for chancroid.

When can I have sex again?

You should not have sex until all of the chancroid sores have completely healed and disappeared. Also, because a person can infect others even when there are no symptoms of chancroid, you should always use a condom during sex.

How can I keep from getting chancroid again?

You can keep from getting chancroid, or any other sexually transmitted disease, by not having sex with anyone (abstinence) or by having sex only with a non-infected partner who has sex only with you. If you or your partner has other sexual partners, you should use a condom during sex.

If you suspect that you have been exposed to chancroid or another STD, go to the clinic or to your doctor right away. Make sure your partner(s) is/are treated, too.

For more information, call the clinic:

or call SC AIDS/STD Hotline
1•800•322•AIDS
2 4 3 7



South Carolina Department of Health
and Environmental Control

ML-013099 5/2010

¿Qué clase de problema tengo?

Chancroide

¿Qué es el chancroide?

El chancroide o chancro blando es causado por un germen o bacteria, que causa llagas o lesiones en el área genital e hinchazón de los ganglios linfáticos de la ingle.

¿Cómo se contrae chancroide?

El chancroide se transmite de una persona a otra por medio del contacto sexual. La infección ocurre cuando la lesión de chancroide de una persona está expuesta a las membranas mucosas o a la piel rota de su pareja sexual.

¿Cómo puedo saber si tengo chancroide?

El chancroide causa una o muchas llagas o lesiones dolorosas en el pene, o en o alrededor de la vagina o el recto. Estas llagas empiezan como pápulas sensibles rodeadas de un área enrojecida. Luego se convierten en llagas dolorosas que frecuentemente tienen mal olor. Normalmente las llagas son más dolorosas en los hombres. También puede haber dolor al orinar, dolor o sangrado del recto, y en mujeres, dolor al tener relaciones sexuales y descarga vaginal y dolor durante las relaciones sexuales. A menudo, los ganglios linfáticos en el área de la ingle están inflamados y dolorosos y pueden reventar.

¿Es peligrosos el chancroide?

El chancroide puede ser una infección seria. Las lesiones pueden desarrollar una infección secundaria. También, debido a la infección, el pene puede inflamarse y volverse muy doloroso. Los ganglios linfáticos de la ingle pueden hincharse y reventar, lo que causa problemas graves a la salud. Las lesiones también pueden causar cicatrices.

¿Cómo me curo del chancroide?

El chancroide puede curarse con antibióticos. Normalmente se aplica una inyección, pero algunas veces se dan pastillas.

¿Y mi pareja?

Es muy importante que su pareja reciba(n) tratamiento por chancroides. Es muy importante decirles a todas sus parejas sexuales que se hagan una revisión médica y reciban tratamiento por chancroides.

¿Cuándo puedo volver a tener relaciones sexuales?

No debería tener relaciones sexuales hasta que todas las lesiones se hayan curado y desaparecido por completo. También, ya que se puede infectar a otras personas, aunque no haya síntomas de chancroide al tener relaciones sexuales, se debería utilizar un condón.

¿Cómo puedo evitar contagiarme de chancroide en el futuro?

Se puede evitar volver a contagiarse de chancroide o de otra infección de transmisión sexual al no tener relaciones sexuales con nadie (abstinencia) o teniendo relaciones sexuales sólo con una pareja sexual no infectada, que tenga relaciones sexuales solamente con usted. Si usted o su pareja tiene otras parejas sexuales, al tener relaciones sexuales, se debe utilizar un condón.

Si cree que ha estado expuesto a chancroide o a otra infección de transmisión sexual, vaya inmediatamente a la clínica consulte a su doctor. Asegúrese de que su pareja también reciba tratamiento.

Para más información, llame a la clínica:

Información sobre ETS y para remisiones a las clínicas para el tratamiento de ETS, llame a 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636), para español marque el número 2.