Información sobre la dosis de ibuprofén

Peso	Dosis Normal (en mg)	Gotas para Infantes 50mg=1.25 ml 1.25ml=1 gotero	Líquido para Niños 5 ml = 100 mg 5 ml = 1 cucharita	Tabletas masticables para niños 50 mg cada una	Tabletas masticables "Junior Strength" 100 mg cada una	Tabletas para Adultos 200 mg cada una
12-17 lbs.	50 mg	1 gotero	½ cucharita	————	————	————
18-23 lbs.	75 mg	1 ½ goteross	¾ cucharita	————	————	————
24-35 lbs.	100 mg	2 goteros	1 cucharita	2 tabletas	1 tableta	————
36-47 lbs.	150 mg	3 goteros	1 ½ cucharita	3 tabletas	1 ½ tabletas	————
48-59 lbs.	200 mg	4 goteros	2 cucharitas	4 tabletas	2 tabletas	1 tableta
60-71 lbs.	250 mg	5 goteros	2 ½ cucharitas	5 tabletas	2 ½ tabletas	1 tableta
72-95 lbs.	300 mg	————	3 cucharitas	6 tabletas	3 tabletas	1 ½ tabletas
96 lbs. y más	400 mg	————	4 cucharitas	8 tabletas	4 tabletas	2 tabletas

D H E C
PROMOTE PROTECT PROSPER

Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur
ML-025151 07/04

El ibuprofén se puede usar para el dolor y/o la fiebre.

¡PARA HACER MEDICIONES PRECISAS, SIEMPRE USE UN GOTERO, UNA JERINGA O UNA TAZA!

¡SÓLO USE EL GOTERO EN LA PAQUETE PARA GOTA INFANTES!

NO USE CUCHARAS DE LA COCINA. COMO LAS CUCHARAS TIENEN TAMAÑOS DIFERENTES, PUEDE SER QUE USTED LE DÉ A SU HIJO, DEMASIADA O MUY POCA MEDICINA.

Agítela bien antes de usarla. Tómela con comida o leche.

Puede darle una dosis cada 6-8 horas, hasta 4 dosis en 24 horas. No le dé más de la dosis recomendada a menos que el doctor le autorice.

Si su hijo tiene vomito, diarrea, dolor de estómago, una historial de úlcera, o es alérgico a la aspirina o ibuprofén, hable con el proveedor de cuidado médico de su niño antes de darle ibuprofén.

Hable con el proveedor de cuidado médico de su niño antes de darle ibuprofén a su infante menor de 6 meses de edad.

Si su niño está tomando otra medicina, como medicina para el catarro, lea la etiqueta para ver si contiene ibuprofén.

No le dé ibuprofén con otra medicina que contenga ibuprofén.

No le dé ibuprofén y acetaminofén al mismo tiempo.

MANTENGA LA IBUPROFÉN EN UN ÁREA FRESCA Y SECA, FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

Comuníquese con el proveedor de cuidado médico INMEDIATAMENTE si su niño toma demasiado ibuprofén.