


TB is spread when a person with TB disease coughs, sings, or speaks and you breathe the air contaminated with TB germs.

The germs reach your lungs. From there, they can go to other parts of your body.



Your body fights the TB germs.


STOP TB

Taking your TB medicine is very important. You need to take the medicine to help get better and to prevent the spread of TB germs to others.




You get TB DISEASE when the TB germs multiply and attack your lungs or other parts of your body. When this happens,

- ◆ You have a positive TB skin test or TB blood test.
- ◆ You feel sick with cough, fever, weight loss, chest pain, or sweating at night.
- ◆ You have active TB germs in your body.
- ◆ You may give TB germs to others.
- ◆ You may have an abnormal chest x-ray.





If your body controls the germs, you have LATENT TB INFECTION. When this happens,

- ◆ You may have a positive TB skin test or TB blood test.
- ◆ You don't feel sick.
- ◆ You don't have TB symptoms.
- ◆ You can't give TB germs to others.
- ◆ You have a normal chest x-ray.



You can take medicine to treat LATENT TB INFECTION and prevent getting TB DISEASE.





La tuberculosis se propaga cuando una persona enferma tose, canta o habla y usted respira el aire contaminado con los microbios de la tuberculosis.


Tomar su medicina para la tuberculosis es muy importante. Necesita tomar la medicina para mejorarse y evitar contagiar a otras personas con los microbios de la tuberculosis.




Esta enfermedad se contrae cuando los microbios de la tuberculosis se multiplican, y atacan los pulmones y otras partes del cuerpo. Cuando esto ocurre:

- ◆ Usted tiene resultados positivos a la prueba cutánea de la tuberculina o al examen de sangre para detectar la tuberculosis.
- ◆ Se siente enfermo con tos, tiene fiebre, pérdida de peso, dolor en el pecho o sudores nocturnos.
- ◆ Tiene microbios de la enfermedad de tuberculosis en su cuerpo.
- ◆ Puede pasarles los microbios de tuberculosis a otras personas.
- ◆ Puede tener una radiografía de tórax anormal.


Alto a la Tuberculosis




Puede tomar medicinas para el tratamiento de la **INFECCIÓN DE TUBERCULOSIS LATENTE** y evitar llegar a tener la **ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS**.



Los microbios entran en sus pulmones. De allí, pueden irse a otras partes de su cuerpo.



Su organismo lucha contra los microbios de la tuberculosis.



Si su cuerpo logra controlar los microbios, usted tendrá la **INFECCIÓN DE TUBERCULOSIS LATENTE**. Cuando esto ocurre:

- ◆ Tiene resultados positivos a la prueba cutánea de la tuberculina o al examen de sangre para detectar la tuberculosis.
- ◆ No se siente enfermo.
- ◆ No tiene síntomas de tuberculosis.
- ◆ No puede pasarles los microbios de tuberculosis a otras personas.
- ◆ Tiene radiografía de tórax normal.

